

SOMATOSTATIN-EUMEDICA

PIERWSZY WYBÓR W LECZENIU KRWAWIENIA Z ŻYŁAKÓW PRZEŁYKU

DAWKOWANIE

1

PIERWSZA DOBA

BOLUS 250 µg > 1 minuta + **WLEW CIĄGŁY** dożylny
1 ampułka á 3 mg/11 h


+

WLEW CIĄGŁY dożylny
1 ampułka á 3 mg/12 h

2

DRUGA I KOLEJNA DOBA
(max. do 5 DNI)

WLEW CIĄGŁY dożylny
6 mg/24 h, 2 ampułki á 3 mg/24 h



PRZYGOTOWANIE ROZTWORU SOMATOSTATIN – EUMEDICA

PODANIE DOŻYLNIE ZA POMOCĄ POMPY INFUZYJNEJ

1

0,9% NaCl PROSZEK



1 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej dodać do 3 mg proszku Somatostatin – Eumedica.

2



Rozcieńczyć roztwór w 0,9% soli fizjologicznej do objętości 48 ml.

3

Bolus 4 ml roztworu



Pobrać 4 ml roztworu (=bolus 250 µg)
Podać w czasie > 1 minuty.

4



Pozostałe 44 ml podawać w infuzji 4 ml/h przez 11 h
Zalecane natężenie przepływu: 3,5 µg/kg/h.

5

Należy zapewnić ciągłość infuzji leku. Przed upływem dawkowania należy przygotować kolejny roztwór z 3 mg leku na 12 godzin infuzji (bez bolusa).

6

W przypadku dłuższej przerwy w infuzji (> 10 min.) należy podać kolejny bolus 250 µg.
Można przygotować roztwór 2 ampułek á 3 mg jednorazowo, rozcieńczyć do 48 ml i podawać w infuzji 2 ml/h przez 24 h.
Zalecane natężenie: 3,5 µg/kg/h.

EUMEDICA
Pharmaceuticals
Ensuring medical care continuity

ewo pharma



SOMATOSTATIN-EUMEDICA

LECZENIE PRZETOKI ŻOŁĄDKOWO-JELITOWEJ I TRZUSTKOWEJ


DAWKOWANIE

1

WLEW CIĄGŁY DOŻYLNNY = **6 mg** /dobę (2 ampułki á 3mg) **do czasu wygojenia przetoki**

2


WLEW CIĄGŁY DOŻYLNNY = **3 mg** /dobę (1 ampułka á 3mg) **przez kolejne 48 godzin**



PRZYGOTOWANIE ROZTWORU SOMATOSTATIN – EUMEDICA

PODANIE DOŻYLNNE ZA POMOCĄ POMPY INFUZYJNEJ

1



1 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej dodać do 3 mg proszku Somatostatin – Eumedica.

2



Rozcieńczyć roztwór w 0,9% soli fizjologicznej do objętości 48 ml.

3



48 ml roztworu podawać w infuzji **4 ml/h** przez 12 h.
Zalecane natężenie przepływu do zamknięcia przetoki: 3,5 µg/kg/h.

4

Należy zapewnić ciągłość infuzji leku.
Przed upływem dawkowania należy przygotować kolejny roztwór z 3 mg leku na 12 godzin infuzji.

5

Można przygotować roztwór 2 ampułek á 3 mg jednorazowo, rozcieńczyć do 48 ml i podawać w infuzji **2 ml/h** przez 24 h.
Zalecane natężenie przepływu po zamknięciu przetoki: 1,75 µg/kg/h.

EUMEDICA
Pharmaceuticals
Ensuring medical care continuity

ewopharma